

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Coopersect vet. 10 mg/ml påflekkingsvæske, oppløsning til storfe og småfe

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Virkestoff(er):

Deltametrin 10 mg

Hjelpestoff(er):

Triglyserider av middels kjedelengde ad 1 ml

3. LEGEMIDDELFORM

Påflekkingsvæske, oppløsning.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter)

Storfe og småfe.

4.2 Indikasjoner, med angivelse av målarter

Forebygging og behandling av flåttinfestasjon (*Ixodes ricinus*) hos sau, lam og storfe. Bekjempelse av lus og flueplage hos storfe, samt lus og sauekrabbe hos sau.

4.3 Kontraindikasjoner

Ingen.

4.4 Spesielle advarsler for hver enkelt mållart

Kyr behandles etter kveldsmelking.
Ved innendørs behandling luftes lokalene godt.

4.5 Særlige forholdsregler

Særlige forholdsregler ved bruk hos dyr

Ingen.

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr

Kan gi hudreaksjoner. Bruk hansker. Ved sprut på slimhinner og hud vaskes med såpe og rikelig vann. Unngå å spise, drikke og røyke samtidig med håndtering av Coopersect vet.

4.6 Bivirkninger (frekvens og alvorlighetsgrad)

I sjeldne tilfeller kan det forekomme utilpasshet (dårlig appetitt, muskelsitring, lett uro) i ca. 1 døgn etter behandling. Tilstanden er forbigående og ufarlig.

4.7 Bruk under drektighet, diegiving eller egglegging

Coopersect vet. kan brukes til drektige og diegivende dyr.

4.8 Interaksjoner med andre legemidler og andre former for interaksjoner

Ingen kjente.

4.9 Dosering og tilførselsvei

Lam: 2,5 - 5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt.

Sau: 5 ml appliseres mellom skulderbladene. Skill ull for å få god hudkontakt.

Kalv: 5 - 10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot.
Skill hårene for å få god hudkontakt.

Ku: 10 ml appliseres langs dorsale midtlinje fra skulderblad til halerot.

For kontroll av flått behandles dyret hver 4.-6. uke.

For kontroll av fluer behandles dyret fra 2-6 ukers intervaller.

4.10 Overdosering (symptomer, førstehjelp, antidoter), om nødvendig

Omsetning av deltametrin er meget hurtig i pattedyr, og neurotoksisk påvirkning ses først ved svært høye doser. Det finnes ingen spesifikk behandling mot en eventuell overdosering.

4.11 Tilbakeholdelsestid(er)

Storfe:

Slakt: 14 dager.

Melk: 0 dager.

Sau:

Slakt: 28 dager.

Melk: Ikke tillatt brukt til lakterende sau som produserer melk til konsum.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

Farmakoterapeutisk gruppe: Ektoparasittmiddel til utvortes bruk, ATCvet-kode: QP53AC11.

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Deltametrin er et syntetisk pyretroid med kraftig insekticid og acaricid effekt, og virker ved kontakt og ved opptak i parasittene. Deltametrin virker ved å blokkere insektenes nervesystem, noe som medfører ødelagt motorikk og orienteringsevne og derpå følgende parese og død. Deltametrin hemmer også produksjonen av levedyktige egg.

5.2 Farmakokinetiske opplysninger

Etter applikasjon fordeler deltametrin seg i hele hudoverflaten, men absorberes i svært liten grad.

5.3 Miljøegenskaper

Deltametrin er giftig for fisk og andre vannlevende organismer, og er også toksisk for nytteinsekter. Meget stabilt ved lufteksponering, og relativt stabilt ved lyspåvirkning, men ved påvirkning av sollys skjer cis-trans-isomerering og en splitting av esterbindingen over tid. I jord skjer en mikrobiologisk nedbrytning i løpet av 1-2 uker. Alkalisk miljø påskynder nedbrytningen.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Liste over hjelpestoffer

Triglyserider

6.2 Uforlikeligheter

Ingen kjente.

6.3 Holdbarhet

Holdbarhet for preparatet i uåpnet salgspakning:
5 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Skal ikke oppbevares over 25 °C.

6.5 Indre emballasje, type og sammensetning

Plastflaske 250 ml.

6.6 Særlige forholdsregler for deponering av ubrukt veterinærpreparat eller av avfallsmaterialer fra bruken av slike preparater

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale krav. Vann og vassdrag må ikke kontamineres med Coopersect vet., da preparatet er skadelig for fisk og andre vannlevende organismer.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(NUMRE)

7729

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE/SISTE FORNYELSE

09.04.1992/09.04.2007

10. OPPDATERINGSDATO

2010-02-10

FORBUD MOT SALG, UTLEVERING OG/ELLER BRUK

Ikke relevant.